

## Cushings syndrom: Spørgeskema omhandlende livskvalitet

Ved at udfylde dette spørgeskema kan du hjælpe din dyrlæge med at forstå din hunds fremskridt og se, om Vetoryl har hjulpet med at genoprette helbredet og energien.

---

### Oplysninger om dig og din hund

Dags dato   /   /

Dit efternavn \_\_\_\_\_ Hundens navn \_\_\_\_\_

Hundens køn  Han  Hun

Er han/hun neutraliseret?  Ja  Nej Hvor gammel er din hund?   år   måneder

Hvilken race er din hund? \_\_\_\_\_

Hvornår fik din hund sidst en Vetorylkapsel? \_\_\_\_\_ (nøjagtigt klokkeslæt og dato)

Hvor mange gange dagligt giver du Vetoryl? \_\_\_\_\_

Hvilken styrke er de Vetorylkapsler hunden får? \_\_\_\_\_ mg

Hvor mange gange har du glemt at give din hund Vetoryl i løbet af de seneste 28 dage (markér det korrekte felt)

- Ingen gange
- Én gang om måneden
- Flere end én gang om måneden, men færre end én gang om ugen
- Én gang om ugen
- Flere end en gang om ugen

Får din hund anden medicin for tiden? Hvis ja, angiv venligst oplysninger nedenfor.

---

---

---

## Cushings syndrom: Spørgeskema omhandlende livskvalitet

### Oplysninger vedrørende de seneste 4 uger

#### 1) Væskeindtag. Tror du, at din hund har drukket:

- Mindre end normalt
- Normalt
- Mere end normalt (f.eks. 1-2 gange det normale)
- Meget mere end normalt

#### 2) Vandladning. Tror du, at urinemængden eller hyppigheden af vandladninger er:

- Mindre/færre end normalt
- Normal
- Større/flere end normalt (f.eks. 1-2 gange det normale)
- Meget større/flere end normalt

### 3) Appetit: Vil du beskrive din hunds appetit som:

- Meget lille (dvs. hunden ikke spiser eller spiser meget lidt)
- Lille (dvs. hunden spiser nogen mad, men det kræver opmuntring at få den til at spise)
- Normal
- Stor (f.eks. hunden spiser al maden hurtigt og vil gerne have mere)
- Meget stor (f.eks. hunden virker meget sulten hele tiden)

### 4) Opkastning og diarré. Hvor tit har hunden kastet op og haft diarré?

- Den har aldrig kastet op eller haft diarré
- Den har kastet op eller haft diarré en enkelt gang
- Den har kastet op eller haft diarré mere end en enkelt gang, men ikke hver dag
- Den har kastet op eller haft diarré hver dag

### 5) Motion. Hvor aktiv er din hund?

- Den ligger på samme sted næsten hele tiden
- Den går ture og vil også gerne lege af og til
- Den er meget aktiv og glad for at løbe rundt, men bliver træt
- Jeg kan ikke køre min hund træt

### 6) Hud og pels. Hvordan vil du beskrive udseendet af hundens pels og hud?

- Meget dårlig (f.eks. tynd pels, skaldede pletter, meget mat pels)
- Dårlig (f.eks. tynd pels, mat pels)
- Rimelig (f.eks. ingen skaldede pletter, lettere mat pels)
- Meget god (f.eks. tyk pels, skinnende pels, ingen skæl)

### 7) Andre problemer. Har hunden noget af følgende?

- Rysten/muskeltrækninger mere end én gang om ugen
- Vedvarende gispen, selv i hvile
- Smerter (hvor som helst)
- Besvær med at bevæge sig
- Psykisk nedstemt (uopmærksom/falder hele tiden i søvn)

### 8) Generelt. Hvordan føler du, at dit kæledyr har det?

- Dårligt det meste af tiden
- Har flere dårlige dage end gode dage
- Glad det meste af tiden, men har indimellem dårlige dage
- Glad hele tiden

### 9) Samlet set. Hvor god føler du, at din hunds nuværende behandling af Cushings syndrom er?

- Min hund har flere sygdomstegn end før behandlingen
- Der er ingen forskel på nu og før behandlingen
- Der er nogen bedring siden behandlingen blev startet
- Min hund er næsten tilbage til sit gamle jeg
- Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg tro, at der ikke var noget galt med min hund

Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark

©Dechra Veterinary Products A/S December 2017



Lægemidlets navn: Vetoryl. Aktivstof: Trilostan. Lægemiddelform: Hårde kapsler. Indikationer: Hos hunde: Til behandling af hypofysær- og adrenal-betinget hyperadrenocorticisme (Cushings syndrom). Kontraindikationer: Bør ikke anvendes til dyr, som lider af primær leversygdom og/eller nyreinsufficiens. 10 mg kapsler: Bør ikke anvendes til hunde, der vejer under 3 kg. 30 mg kapsel: Bør ikke anvendes til hunde, der vejer under 3 kg. 60 mg kapsel: Bør ikke anvendes til hunde, der vejer under 10 kg. 120 mg kapsel: Bør ikke anvendes til hunde, der vejer under 20 kg. Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger og risici: Iatrogen Cushings syndrom eller hypokortisolæmi bør skelnes fra hypoadrenokorticisme ved evaluering af elektrolytter i serum. Symptomer, som skyldes iatrogen hypoadrenocorticisme, herunder svaghed, lethargi, anoreksi, opkastning og diarré, kan forekomme. Disse forekommer især, hvis hunden ikke er blevet overvåget tilstrækkeligt. Symptomerne er som oftest reversible og fortager sig indenfor en varierende tidsperiode efter ophørt behandling. Akut Addisons krise (kollaps) kan også forekomme. Lethargi, opkastning, diarré og anoreksi er observeret hos hunde behandlet med trilostan, uden at hypoadrenocorticisme kunne påvises. Enkelte, isolerede tilfælde af adrenal nekrose, som kan føre til hypoadrenocorticisme, er observeret hos trilostan-behandlede hunde. Subklinisk renal dysfunktion kan afsløres ved behandling med produktet. Da det endogene kortikosteroidniveau reduceres, kan behandlingen også afsløre eventuel arthritis. Der er rapporteret om enkelte pludselige dødsfald under behandlingen. Andre milde, sjældent forekommende bivirkninger inkluderer koordinationsbesvær, øget spytafsondring, oppustethed, muskelrystelser og hudforandringer. Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller i nogen dyr til avl. Dosering: Indgives oralt en gang om dagen sammen med foder. Startdosis for behandlingen er ca. 2 mg / kg/dag, i forhold til mulige kombinationer af kapselstørrelser. Dosis titrer i forhold til den individuelle respons som lægges fast gennem monitorering (se nedenfor). Hvis det er nødvendigt med en forøget dosis, bør der anvendes en kombination af kapsler med forskellige styrker, som muliggør en langsom stigning i den daglige dosis (givet en gang dagligt). En bred vifte af kapsler med forskellige styrker muliggør en optimal individuel dosering. Giv altid den lavest mulige dosis som medfører at de kliniske tegn er under kontrol. Hvis symptomerne ikke er tilfredsstillende kontrolleret gennem en hel 24-timers periode mellem to doseringer, kan man i sidste ende overveje at forøge dosis med op til 50% og dele den fulde dagsdosis op på to daglige doser morgen og aften. Kapslerne må ikke deles eller åbnes. Hos enkelte dyr kan det være nødvendigt med doser, der ligger væsentligt over 10 mg/kg/dag. I disse tilfælde bør overvågningen af dyret intensiveres. Pakningsstørrelse: 10mg, 30mg, 60mg og 120mg. Alle styrker findes i 30 stk pakninger. Pris: Se dagsaktuel pris på [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk). Udleveringsgruppe: B. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, BD23 2RW North Yorkshire, Storbritannien